

Udredning af æggestokkræft i almen praksis

Hvornår kan man bruge gynækologisk ja/nej-undersøgelse?

- Til kvinder ≥ 40 år med vage og uspecifikke symptomer – **OVARIE**
- Manglende forklaring på kvindens symptomer
- Lægens intuition om at ”noget ikke stemmer”
- OBS! Kvinder over 50 år med mistanke til irritabel tyktarm.
- Kvinder der opfylder kriterierne for kræftpakkehenvielse skal henvises i kræftpakken

Omfang af abdomen periodevist øget

Vandladningsgener

Abdominale smerter

Reduceret appetit

Irritabel tyktarmssymptomer

Energitab



Det praktiske omkring gynækologisk ja/nej-undersøgelse?



Trin 1:

Kvinde ≥ 40 år, der præsenterer sig med vage og uspecifikke symptomer \rightarrow Henvises til "gyn ja/nej-us" på en af flg.to måder:

- 1. Pakkehenvisninger** (findes under "gyn ja/nej-us")
- 2. Normal henvisning til gynækologisk fællesvisitation**, hvor det noteres at kvinden ønskes undersøgt via "gyn ja/nej-us".
OBS! Husk kvindens mobilnummer.



Trin 2:

Trænede sonografer laver transvaginal ultralyd (TVU) på hhv. AUH Skejby og Regionshospitalet Randers (eftermiddage).

Fire udfald ved TVU:

1. Retur til egen læge med umiddelbar normal undersøgelse.
2. Henvist til opfølgning ved gynækolog.
3. Henvist til udredning i kræftpakke.
4. Der er fundet et fibrom.

OBS! Hvis kvinden fortsætter med at have symptomer skal kræftpakke overvejes.